

معلومات عن الإصبع الز nad



مستشفى طيبة
TAIBA HOSPITAL

1808088 | [@taibahospital](http://www.taibahospital.com) | www.taibahospital.com

ما هو الاصبع الزناد ؟

الإصبع الزنادي هي حالة يكون فيها الألم أو تصلب أو عدم راحة عند تحريك الإصبع المصاب. في بعض الأحيان ، قد يعلق الإصبع المصاب عند الانحناء ويصعب تقويمه مرة أخرى. يحدث هذا عندما يكون هناك التهاب وتورم في الوتر الذي ينزلق عادة بسلسلة تحت نفق ضيق. ومن ثم فإن التورم يسبب الاحتكاك مع الغلاف المحيط يظهر على شكل ألم وتنيس أثناء حركة الإصبع.

ما الذي يسبب الاصبع الزنادي ؟

قد ترافق الإصبع الزنادي مع النقرس والسكري والتهاب المفاصل الروماتويدي أو حتى بعض الأنشطة الرياضية التي تنقل كاهل اليد. في بعض الأحيان لا يوجد سبب واضح ، وتكون معظم الحالات نتيجة لالتهاب متراكم بسبب الاستخدام المفرط لليد.

ما هي أعراض الاصبع الزنادي ؟

قد تبدأ في الشعور بصعوبة وألم في قاعدة الإصبع المصاب. يمكن أيضًا العثور على تورم في المنطقة. قد يحدث القفل مع ألم في الإصبع المصاب.

كيف يتم علاج الاصبع الزنادي ؟

العلاج التحفظي:

الراحة من الاستخدام المكثف لليد مع استخدام جبيرة الزناد والمسكات وأخذ المشورة بشأن تعديل النشاط من قبل المعالج المهني. ومع ذلك، فإن نتائج هذا العلاج لا يمكن التنبؤ بها وقد لا تكون فعالة للجميع، للشعور بالشفاء بشكل كبير كبير مع هذا العلاج ، قد يستغرق الأمر ما يصل إلى 3 أشهر وتحتار النتائج باختلاف العوامل بما في ذلك مرحلة الالتهاب.



حقن الستيرويد:


هي طريقة موثوقة لتنقیل الألم وعدم الراحة. تكون حقنة الستيرويد من خليط من مخدر موضعي ومضاد للالتهابات. إنه إجراء بسيط يمكن إجراؤه في العيادة. فعالية الحقن 70%-60%.

المخاطر المحتملة لحقن الستيرويد (الكورتيزون):

- عدوى
- نزيف
- التوهج الستيرويدي 30%
- نقص التصبغ (تبیض البشرة)
- ضمور الدهون
- إصابة الأعصاب والأوعية
- تكرار الحالة (40%-30%)
- تمزق الوتر
- ارتفاع مؤقت في سكر الدم لدى مرضى السكري
- انخفاض محتمل في إنتاج الحليب لدى النساء المرضعات

طريقة العلاج بالستيرويد

سيتم إعطاء الحقنة في العيادة، بعدها يتم وضع ضمادة على مكان الحقن، ومن الممكن إزالتها بعد 3 ساعات. يرجى التأكد من جفاف اليد قبل إزالة الضمادة. سيكون إصبعك أيضاً مخدراً لمدة 3 ساعات بعد الحقن. تظهر نتيجة الحقن عادة ما بين 2-3 أسابيع بعد الحقن.



الجراحة:

يقدم حلّاً علاجيّاً للمشكلة. يُلْجأُ إليه عند استمرار الأعراض على الرغم من العلاج غير الجراحي وعندما يحدُث التكرار بعد حقن الستيرويد.

"التحريج الجراحي للبكرة A1" هو إجراء جراحي يتم إجراؤه تحت تأثير التخدير الموضعي. تستغرق العملية حوالي 30 دقيقة.

المخاطر المحتملة:

- رد فعل تحسسي للتخدير الموضعي
- عدوى
- إصابة الوتر
- تكوين الندبات
- تصلب الأصابع
- تحرير غير مكتمل
- إصابة الأعصاب والأوعية الدموية

التعافي بعد الجراحة:

سيتم تضميد الجرح لمدة أسبوعين تقريباً قبل إزالة الغرز. بعد الجراحة ستكون قادراً على تحريك إصبعك دون قيود، كما يمكن القيادة أيضاً.

قد تتم إحالة بعض المرضى إلى علاج اليد بعد الجراحة لتحسين نطاق الحركة وتنيس المفاصل.